

ロングメディカル系国産ブラックグレー




まつ連基準適合品



ご使用方法


【セット方法】

- チューブの下部を持ち、ノズルとキャップのセットごと左に回し動かなくなるまでしっかりと閉めます




【正しい持ち方】

- 開閉の際は、キャップ部分とノズル部分もしくはチューブの下部を持ちます
- 持ち運びの際は、ノズル部分もしくはチューブの下部を持ちます
- ※チューブ中央（本体）を持つとグレーが圧迫され、キャップを開けた際に溢れ出す恐れがあります




【ご使用前】

- キャップを開ける際は、ノズル部分もしくはチューブの下部を持ちキャップ部分のみを右に回し開けます
- チューブの下部を押し、少しづつ出します
成分分離を起こさないチューブ構造のため、ご使用前に振る必要はございません
- ※チューブ中央（本体）を押すと、グレーが勢いよく溢れ出す恐れがあります



【ご使用後】

- チューブの下部を持ち、ノズルについていたグレーをきれいに拭き取り、キャップ内部のグレーは綿棒で拭き取る
※きれいに拭き取りを行なわないと、キャップの開閉ができなくなります
- ※ノズルの拭き取りにはティッシュペーパーやコットンのご使用はお避けください
毛羽立った繊維が張り付き、キャップが閉まりにくくなる原因となります
- ノズル部分もしくはチューブの下部を持ちキャップを閉めます



【閉鎖時注意事項】

- ノズル・キャップを完全に閉めないとチューブ内に空気が入り、グレーの劣化が早くなります
- グレーが溢れた際はキャップを閉めても、中で溢れてしまいます
溢れたグレーが止まるまでお待ちいただき、ノズルをしっかりと拭いてから閉めてください
- キャップ内部でグレーが固まった場合は、予備のノズル・キャップに交換する、もしくは付属の安全ピンキャップを使用してください

【使用環境】

- 温度調節：常温（25度程度）が望ましく、冷蔵庫保管のグレーを使用する際は必ず常温に戻し使用します

（グレー外装に触れてひんやりとしている場合は、常温に戻っていません）

常温に戻さずに使用するとシアノアクリレート本来の性能が発揮できません

- グレーがドロドロしている場合

《原 因》グレー保管温度が高すぎます

《対処方法》劣化しているため破棄が望ましい

再冷却を行なっても本来の接着強度には戻りません

- グレーがさらさらしている場合

《原 因》グレー保管温度が低すぎます

《対処方法》常温に戻して使用すると、本来の接着強度に戻ります

- 湿度・水分量調節：40%～60%が望ましい

涙目・クレンジング後の方はしっかりと水分を除去後、使用します

水分量の多い箇所・湿度の高い時期（場所）で使用した場合は、白化現象が起こることがあります

*白化現象とは…グレーが硬化する際に揮発する成分が水分と過剰に反応し、使用箇所が白化する現象

白化現象が起つてもグレーの持続性・強度に変わりはございません

【保管】

- 温度調節：開封前…冷蔵庫保管が望ましい

開封後…常温（25度程度）が望ましい

直射日光、温度・湿度の高い場所などで保管されると使用感が変化する可能性があります

- 状 態：アルミパックに立てて入れ、アルミパックも立てて保管します

横・逆さの状態で保管するとキャップ内部でグレーが逆流し、蓋が開かなくなることがあります
(アルミパックが光を遮断し、光吸収によるグレー劣化を最小限に抑えます)

- 期 限：開封前…外装アルミパックに記載（10ヶ月以内）

開封後…2ヶ月以内

使用環境・保管状態により期限は前後します

開封後、使用期間内であっても粘りが出てきた場合は交換時期です

【使用上の注意】

- アレルギー体质の方や肌の弱い方、傷・かぶれのある近くには使用しないでください
(アレルギーの有無は過去のトラブル有無を確認し、パッチテストをお勧めください)

- グレーが漏出する場合は、直ちにまづけエクステンションを除去（リムーブ）し、医師の診断を受けてください

- 万が一、目に入った場合は、目をこすらず精製水で繰り返し洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください
リムーバー・アセトン溶剤は絶対に使用しないでください

- 直接、皮膚には付かないようにしてください
皮膚に付着した場合は無理にはがさず、お湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください

- 使用時は換気を行い、気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は新鮮な空気の場所に移り安静にしてください

- 引火性であるため、火気にご注意ください

- 布などしみこみやすいものに多量に付着した際は急速に反応し発熱します
皮膚に接着・隣接した箇所の場合は火傷にご注意ください

- 幼児の手の届かないようにし、いたずらに注意してください
万が一、誤飲した場合は、直ちに医師の診断を受けてください

【アレルギー反応とパッチテストについて】

施術前、お客様に過去の薬剤などによるアレルギー反応の有無をご確認・事前にパッチテストをご案内されますことをお勧めいたします。

パッチテストはまづけエクステンションを数本付け数時間～1日程度様子をみていただき、変化がない場合に、グレーを使用することをお勧めいたします。

なお、パッチテストで問題がない方も施術中・施術後にアレルギー反応がでる場合もございます。

その際は、直ちにまづけエクステンションを除去（リムーブ）し医師の診断を受けてください。

大切に保管し、必要な際にお読みください

株式会社 kichi
omeエンタープライズ

T E L. 0120-965-583

F A X. 06-6252-3774

営業時間 /10:00～18:00

定休日 / 土・日・祝

T E L. 0120-965-583

F A X. 06-6252-3774

E-mail. info@ome-shouzai.com

online shop. https://www.ome-shop.jp